

Арахис

Сорта



Болд, Раннер

Характеризуются удлинённой формой и кожурой красноватого цвета

Калибр: 38-42, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80



Ява, Спэниш

Характеризуются небольшими ядрами сферической формы и кожурой розоватого цвета


Калибр: 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100



Валенсия

Характеризуются небольшой формой ядер и кожурой красного цвета

Калибр: макс. 50-60




Вирджиния

Характеризуются самыми большими среди других сортов ядрами и кожурой розоватого цвета

Калибр: макс. 21-25

Сезоны выращивания



Формы



в скорлупе



очищенный



бланшированный



сплит



дробленый

Минимальные требования

Общие:

Арахис должен быть доброкачественным, т.е. пригодным для употребления в пищу. Арахис не должен иметь посторонний вкус и запах, а также содержать живых насекомых-вредителей, независимо от стадии их развития.

Специальные:

Содержание влаги	Арахис в скорлупе ≤ 10%; ядра арахиса ≤ 9%
Заплесневелые, прогорклые или гнилые ядра	≤ 0,2% m/m
Посторонние примеси животного происхождения (в том числе насекомые)	≤ 0,1% m/m
Прочие органические и неорганические посторонние вещества	Арахис в скорлупе ≤ 0,5% m/m Ядра арахиса ≤ 0,5% m/m

Допуски по качеству

Допускаемые дефекты	Процентная доля дефектного продукта
---------------------	-------------------------------------

1. Дефекты боба

1.1 Пустые бобы: свободные от ядер.

3% m/m
10% m/m

1.2 Поврежденные бобы: включая:

а) сморщенные (недостаточно развитые); или

б) бобы со сколами и разбитыми участками, а также с отверстиями, через которые видно ядро.

1.3 Обесцвеченные бобы: имеющие темные пятна от плесени или грязи, затрагивающие 50% поверхности боба.

2. Дефекты ядра

2.1 Поврежденные ядра: включая:

а) повреждения от холода, в результате которого ядро стало твердым или обесцвеченным;

1% m/m

б) сморщенные ядра, не полностью развитые;

5% m/m

с) поврежденные насекомыми;

2% m/m

д) с механическими повреждениями;

2% m/m

е) проросшие ядра.

2% m/m

2.2 Обесцвеченные ядра: не поврежденные, но подвергшиеся следующим изменениям:

3% m/m

а) в цвете ядра (семядолей), которое стало темно-желтого цвета или имеет легкую желтизну; и/или

б) изменение цвета кожуры, которая стала темно-коричневой, темно-серой, темно-синей или черной, у более 25% ядра.

2.3 Разбитые ядра и сплит: разбитые ядра — сломанные более, чем на четверть.

3% m/m

Сплит — разделенные на две части.

3. Другой арахис, кроме указанного типа.

5% m/m